尹珊,李勇,马杰,等,2020. 延伸期温度预报误差订正技术初探[J]. 气象,46(3):412-419. Yin S, Li Y, Ma J, et al, 2020. Preliminary study on bias correction for the extended-range temperature forecast[J]. Meteor Mon, 46(3):412-419(in Chinese).

延伸期温度预报误差订正技术初探^{*}

尹 珊¹ 李 勇¹ 马 杰¹ 邓 星² 蔡芴宁¹

1 国家气象中心,北京 100081

2 龙源电力集团股份有限公司,北京 100034

提 要: 应用滑动平均误差订正方法和历史偏差订正方法,对欧洲中期天气预报中心的数值模式延伸期 2 m 温度预报进行误差订正。研究发现,应用滑动平均误差订正方法进行 11~15 d 逐日温度预报订正时,25~30 d 是最优的训练期长度。对 2018 年订正预报的检验分析显示,应用上述两种误差订正方法均可减小模式预报的系统偏差,有效修正模式温度预报较实况明显偏低的问题,并将预报准确率提高 30% 以上。在 6—10 月,订正后的温度预报平均绝对误差基本在 2℃ 以内,具有一定的参考性,其业务化产品可支撑预报员的业务预报需求。在 15 d 内的延伸期预报时效上,两种订正方法对温度预报的订正效果差异并不明显。随着时效的延长,历史偏差订正方法的优势逐渐显现。

关键词: 误差订正,延伸期温度预报,滑动平均,历史偏差

中图分类号: P456

文献标志码: A

DOI: 10.7519/j.issn.1000-0526.2020.03.012

Preliminary Study on Bias Correction for the Extended-Range Temperature Forecast

YIN Shan¹ LI Yong¹ MA Jie¹ DENG Xing² CAI Xiangning¹

1 National Meteorological Centre, Beijing 100081

2 China Longyuan Power Group Corporation Limited, Beijing 100034

Abstract: The moving mean bias correction method and the historical deviation correction method are used to correct the error of the extended-range 2 m temperature forecast of the ECMWF numerical model. Through the study of the moving training period, the optimal training period length of the moving mean bias correction method is 25—30 days for daily temperature forecast from 11 to 15 days. The verification of corrected temperature forecast in 2018 shows that the application of these two temperature deviation correction methods can correct the deviation that the temperature forecast in model is significantly lower than observation, and improve the forecast accuracy by 30% at least. The mean absolute error of the corrected temperature forecast is basically less than 2℃ from June to October, which has certain reference value and could provide good support for forecasters. There is no obvious difference between the two methods in the bias correction effect of the extended-range forecast within 15 days. With the extension of forecast lead time, the advantages of the historical deviation correction method show up gradually.

Key words: bias correction, extended-range temperature forecast, moving mean, historical deviation

^{*} 国家科技支撑计划(2015BAC03B04 和 2015BAC03B07)和中国气象局气象预报业务关键技术发展专项[YBGJXM(2018)04]共同资助
2019 年 4 月 22 日收稿; 2020 年 2 月 25 日收修定稿

第一作者:尹珊,主要从事中长期天气预报研究. Email: yinshan21@sina.com

通讯作者:李勇,主要从事中长期天气预报理论及技术研究. Email: liy@cma.gov.cn

引言

在气象业务中,延伸期预报涵盖 10~30 d 预报时效,它介于中短期预报和短期气候预测的预报缝隙中,科研和预报难度均较大。但从社会发展和经济建设的需求出发,人们希望得到这种更长预报时效的精细化预报。

由于数值模式初始场的不确定性及其对大气的近似处理,加之大气本身是存在随机性的非线性系统(Lorenz,1963;丑纪范,1990),数值模式不可避免地存在预报偏差(任宏利和丑纪范,2005;Cui et al,2012)。运用一些统计后处理方法并结合集合预报可以对模式预报的不确定性和系统偏差予以订正,对提升预报性能有很大帮助(Hamill and Whitaker,2007;Cui et al,2012)。结合大气动力学和统计学方法来处理数值模式预报产品的模式输出统计(model output statistics, MOS)法由 Glahn and Lowry(1972)提出以来得到广泛应用(刘还珠等,2004;Taylor and Leslie,2005)。陈豫英等(2011)将 MOS 方法用于预报宁夏未来 40 d 逐候的平均气温,研究显示预报效果较模式直接输出有显著提高。然而该方法需要较长时间的数据训练统计模型,在当前数值预报模型频繁更新的情况下应用效果已不能达到最优(佟华等,2014)。因此,众多采用较短时间的模式结果就能进行误差订正的技术方法不断涌现。研究指出,卡尔曼滤波的订正方法对集合预报的中短期温度预报订正效果显著(马清等,2008;李莉等,2011;邱学兴等,2012)。Cui et al(2012)和 Guan et al(2015)的研究表明,结合格点分析场应用基于卡尔曼滤波的衰减平均偏差估计法也能有效提高模式对 1~16 d 地面温度预报的准确率。崔慧慧和智协飞(2013)探索了运用多模式集成的方法对延伸期 10~15 d 天气过程的气温预报进行订正的可行性。此外,美国环境预报中心运用再预报数据的历史偏差进行延伸期逐周温度预报订正,也取得了较好的预报效果(Guan et al,2019)。

上述研究在延伸期温度的天气过程预报方面做了较好的尝试,并探索了将中短期订正技术应用于较长时间尺度的可能性。然而,在中国延伸期逐日温度预报的订正效果尚不明确。同时,受实际业务预报中的数据储备和时效所限,某些订正方法并不一定能较好地应用于产品研发。滑动平均误差订正

是一种基于近期模式预报误差对未来模式预报值进行订正的方法(Stensrud and Yussouf,2005;Cheng and Steenburgh,2007;曾晓青等,2019;薛湛彬等,2019),该方法在国家级业务部门的中短期温度预报中有较好的应用效果(董全等,2012)。本文尝试将该方法推广至延伸期订正预报,探究其适用性。此外,用于美国周气温预报的历史偏差订正方法是否能本地化用于我国精细化逐日预报也有待验证。因此,本文将 ECMWF 数值模式为例,采用这两种方法对延伸期逐日 2 m 温度预报的偏差订正展开研究,探索改善 ECMWF 模式在中国区域延伸期温度预报效果的订正技术,以支撑日常预报业务需求。

1 资料和方法

使用 2015 年 2 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日 ECMWF 模式集合预报 08 时起报的 240~360 h 时效地面 2 m 温度预报和中国 2 093 个站日平均气温观测资料,运用滑动平均误差订正和历史偏差订正两种模式误差订正方法对温度的集合平均预报进行偏差订正。其中,ECMWF 模式集合预报数据的时空分辨率分别为 12 h 和 $0.5^\circ \times 0.5^\circ$,预报区域为 $0^\circ \sim 55^\circ \text{N}$ 、 $70^\circ \sim 150^\circ \text{E}$ 。由于资料分辨率有限,取当日 08 时和 20 时的温度预报平均值近似为日平均温度预报。采用双线性插值方法将格点数据插值到站点上进行误差订正。

选用平均绝对误差(MAE)、系统偏差(SB)和预报准确率(TT_k)对预报产品质量进行检验评估。

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |T_{m_i} - T_{o_i}|$$

$$SB = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T_{m_i} - T_{o_i})$$

式中: T_m 和 T_o 分别为模式预报温度和实况观测值。

$$TT_k = \frac{N_{r_i}}{N_{f_i}} \times 100\%$$

式中: N_{r_i} 和 N_{f_i} 分别是预报正确的站数和预报的总站数,温度预报绝对误差 $\leq 2^\circ \text{C}$ 即为预报正确。

文中试用滑动平均误差订正和历史偏差订正两种方法探索 11~15 d 逐日温度预报订正效果。滑动平均误差订正方法是根据数值模式近 N 日的平均预报误差 ΔT_t ,对数值模式第 t 日起报的未来第 d 日温度预报进行订正:

$$\Delta T_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (T_{m_{t-i-d}} - T_{o_{t-i}})$$

式中, N 为滑动训练期的长度, $T_{m_{t-i-d}}$ 和 $T_{o_{t-i}}$ 分别是模式第 $t-i-d$ 日预报的未来第 d 日的温度和第 $t-i$ 日的台站观测气温实况。温度订正预报为模式预报温度减去模式的平均预报误差, 即 $T_t = T_{m_t} - \Delta T_t$ 。历史偏差订正方法主要基于 2015—2017 年的 ECMWF 逐日集合预报资料估算平均的模式预报偏差(集合平均预报值与台站实况观测的差值)进行订正。订正后的温度预报为模式预报减去当日模式预报偏差值。

2 模式误差分析

图 1 是结合台站观测资料和 ECMWF 模式集合预报历史数据, 估算的该模式对中国不同季节延伸期逐日 2 m 平均温度预报的平均绝对误差。以第 11 d 的预报为例可知, 模式对中国江淮、江南、西南地区东部等地的延伸期日平均温度的预报误差绝对值相对较小, 在 1~3℃ 左右, 在华北、东北地区和华南等地的误差略大。误差最大的区域在新疆北部、西北地区中东部、西藏大部及川西高原等地, 误差可达 5~10℃, 其中西藏东部局地可达 11℃ 及以上。不同季节的误差空间分布较类似, 夏季的预报误差明显小于其他三个季节, 这可能与夏季冷空气过程较少、日变温较其他季节偏小有关。第 12~14 d 的预报误差空间分布与图 1 相似, 随着预报时效的延长, 误差略有加大(图略)。

从 2015—2017 年 ECMWF 模式预报的系统偏差来看, 模式预报的温度在中国大部均较实况偏低, 特别是在青海、甘肃南部、西藏和川西高原等地, 模式预报较实况偏低 3℃ 以上(图 2)。江汉、江淮、江南等地在各季节的预报偏差均较小, 平均系统偏差在 -2~-1℃ 左右。此外, 在夏季的南疆盆地高温区, 模式预报的温度较实况偏高 1~4℃ 左右。冬季, 在新疆北部和内蒙古东北部也存在温度预报偏高的现象, 说明冬季在上述地区模式可能存在冷空气强度预报偏弱或回温幅度预报偏高等问题。与平均绝对误差相似, 整体而言, 中国中东部地区的温度预报系统偏差在夏季最小。

3 滑动训练期预报误差分析

在国家级气象部门温度预报业务中, 滑动平均误

差订正方法使用 2~3 d 作为误差滑动训练长度。为了选取适用于预报订正的延伸期逐日温度预报的滑动训练期, 利用 2015—2017 年集合预报数据分别从 1~40 d 挑选滑动训练时长进行模式逐日温度预报订正试验, 检验分析其平均绝对误差和系统偏差值。经对比分析发现, 无论选用多少天用于滑动平均误差订正, 订正后的预报效果均优于订正前(图 3)。订正前模式预报的平均绝对误差为 2.8~3.8℃, 订正后上述误差明显减小, 说明该方法对延伸期逐日温度预报有一定的订正效果。对于 11~15 d 的预报, 滑动训练期在 10 d 内时, 随着训练期的延长, 平均绝对误差迅速减小。超过 10 d 后, 平均绝对误差减速变缓, 至 25~30 d 达到最小值。另一方面, 相较于订正前全国平均的温度预报明显低于实况观测 2.2~3.8℃, 订正后的平均温度系统偏差显著减小。除选用 40 d 作为滑动训练期的订正后预报系统偏差相对略大外, 其他训练时长的系统偏差差异并不明显(图 4)。在各试验训练期中, 不同时效的预报系统偏差整体较小的有 1、3 和 30 d。

综合上述检验结果可知, 在延伸期逐日温度预报上应用滑动平均误差订正技术时, 25~30 d 是较优的滑动训练期长度。

4 预报订正结果分析

基于前文研究结果, 本文选取 30 d 作为滑动训练期应用滑动平均误差订正技术, 同时运用历史偏差订正方法, 对 2018 年的 ECMWF 模式延伸期逐日温度预报进行了订正。检验发现, 上述两种订正方法对延伸期逐日平均温度均有较好的订正效果。订正前模式对 11~15 d 逐日平均温度预报的平均绝对误差为 3.1~4.0℃, 误差随着时效的延长增加。运用滑动平均误差订正技术订正后的预报平均绝对误差均控制在 2.6℃ 以内; 历史偏差订正方法订正后的为 2.0~2.3℃, 随着时效的延长, 其预报效果相较于滑动平均误差订正产品的优势更明显(图 5a)。订正前模式在各时效预报的系统偏差均较实况偏低 2.2~3.2℃, 而两种订正预报的系统偏差均在 -0.3~0.3℃(图 5b)。在 11~15 d 预报时效的前期, 滑动平均误差订正产品的预报相对于实况偏高, 随后转为偏低, 而历史偏差订正产品的预报则相反, 大部分时效以预报偏低为主, 后转为较实况偏高。

从空间分布上看,两种订正方法对西北地区中东部、西南地区等地的误差订正最为显著,这些地区

也是模式预报误差较大的区域。以第 11 d 的预报为例(图6),订正前的模式预报中2018年日平均温

图 1 2015—2017 年 ECMWF 模式第 11 d 的 2 m 平均温度预报平均绝对误差空间分布 (a)春季,(b)夏季,(c)秋季,(d)冬季

Fig. 1 Spatial distribution of MAE of 2 m mean temperature forecasts with 11 d lead time by ECMWF model during 2015—2017 (a) spring, (b) summer, (c) autumn, (d) winter

图 2 同图 1, 但为系统偏差的空间分布

Fig. 2 Same as Fig. 1, but for the spatial distribution of system bias (SB)

图 3 选用不同滑动训练期订正后的第 11~15 d 全国 2 m 平均温度预报的平均绝对误差

Fig. 3 MAE of corrected 2 m mean temperature forecasts with 11–15 d lead time by using various moving training periods

图 4 同图 3, 但为系统偏差

Fig. 4 Same as Fig. 3, but for SB

图 5 2018 年订正前后全国全年平均的 2 m 平均气温预报的平均绝对误差(a)和系统偏差(b)随预报时效的变化

Fig. 5 MAE (a) and SB (b) of 2 m mean temperature forecasts with 11–15 d lead time before and after corrections over China in 2018

图 6 2018 年预报订正前后第 11 d 的 2 m 平均气温预报平均绝对误差(a, c, e)和系统偏差(b, d, f)的空间分布 (a, b)订正前模式预报, (c, d)滑动平均误差订正预报, (e, f)历史偏差订正预报

Fig. 6 Spatial distribution of MAE (a, c, e) and SB (b, d, f) of 2 m mean temperature forecasts with 11 d lead time before and after corrections in 2018

(a, b) model forecasts, (c, d) moving averaged bias-corrected forecasts, (e, f) historical bias-corrected forecasts

度的平均绝对误差在青藏高原及青海北部超过 5℃,特别是在青藏高原东部和川西高原,误差更为明显。订正后在上述大部地区的预报平均绝对误差为 1~3℃,相对于订正前误差明显减小。在中国中东部地区,两种预报订正方法在南方的订正效果优于北方。随着预报时效的延长,温度预报的平均绝对误差在全国大部均有所升高。历史偏差订正预报的误差增长率低于滑动平均订正预报,特别是在四川盆地、云南和华南东南部沿海地区,在第 15 d 的平均绝对误差仍低于 2℃(图略)。从系统偏差的角度也能看出两种方法对延伸期日平均温度的订正效果十分显著。订正前,模式预报相对于实况存在预报偏低的问题,几乎在全国各地均存在(图 6b),在高原地区和中国西北部地区这一偏差更为明显。订正后,年平均的系统偏差在全国大部明显减少至 1℃以内。在新疆北部、青藏高原中东部、川西高原等地,订正后的系统偏差略高。

此外订正前后温度的预报准确率差别,同样体现出两种温度预报订正方法对 11~15 d 延伸期模式日平均温度预报的改进(图 7)。订正前,温度预报在上述延伸期时效的预报准确率几乎均在 40% 以下,而订正后则基本均达到 50% 以上。相对于订正前的模式预报,订正后的预报准确率的提升超过 30%,在第 15 d 预报时效更达到 50%~60%。此外,应用历史偏差订正方法处理后的温度预报准确率较滑动平均误差订正结果高 1%~4%。

从单站的逐日温度序列(图 8)可以进一步看出,订正后的延伸期时效温度预报的系统性偏差有一定改善。以 2018 年 2—3 月北京和拉萨的温度预报为例,两种订正方法均较好地修正了模式预报较实况明显偏低的问题,订正后的预报值与实况观测更为

接近,具有较好参考性。由于滑动平均误差订正和历史偏差订正方法的优势是对系统性误差的订正,因此,模式对变温幅度及变温时间的预报偏差无法有效修正。例如,在 2 月中旬前期、3 月上旬前期和下旬北京出现了三次冷空气过程,模式明显低估了其降温幅度,订正后的预报同样存在类似问题。

对比订正前后中国中东部(105°E 以东)地区温度预报误差的逐月变化可知,两种订正预报的误差全年各月均小于订正前的模式预报,且在 1—3 月的订正效果尤为明显(图 9a)。在 6—10 月,订正后的温度预报平均绝对误差基本在 2℃ 以内,表现出较好的参考性。1—5 月和 11—12 月的误差较大,是由于在该时段受冷空气影响,我国中东部温度波动较大,从而延伸期时效逐日预报的难度明显加大。但两种订正方法均能较好地订正模式预报温度偏低的问题(图 9b),有一定的参考性。历史偏差订正预报较实况偏低的问题主要出现在上半年,随着月份的推进,该订正预报由较实况偏低逐渐转为略偏高。

综上所述,本文研究的两种订正方法对延伸期 11~15 d ECMWF 模式逐日温度的预报均有较好的订正能力。比较而言,历史偏差订正方法的订正效果略优于滑动平均误差订正方法。

图 7 同图 5a, 但为预报准确率

Fig. 7 Same as Fig. 5a, but for forecast accuracy

图 8 2018 年 2—3 月北京(a)和拉萨(b)单站逐日温度实况及对应的第 11 d 预报结果

Fig. 8 Daily temperature observation and forecasts with 11 d lead time at (a) Beijing and (b) Lhasa stations from February to March in 2018

图 9 中国中东部(105°E 以东)第 11 d 预报的温度平均绝对误差(a)及系统偏差(b)的逐月演变
Fig. 9 Monthly variation of MAE (a) and SB (b) of 2 m temperature forecasts with 11 d lead time over central and eastern China (east to 105°E)

5 结论和讨论

本文研究了滑动平均误差订正方法应用于延伸期逐日预报时的最优滑动训练期长度。在此基础上采用该方法和历史偏差订正方法对延伸期 11~15 d ECMWF 模式日平均温度预报进行了误差订正,并对 2018 年的订正预报进行检验分析。主要研究结果如下。

(1)采用滑动平均误差订正方法改进延伸期模式逐日温度预报时,25~30 d 是最优的滑动训练期长度。

(2)滑动平均误差订正方法和历史偏差订正方法均能有效订正延伸期模式逐日温度预报误差。订正后的平均绝对误差由订正前的 3.1~4.0°C 减少至 2.0~2.6°C,系统偏差由订正前的 -3.2~-2.2°C 减至 -0.3~0.3°C,预报准确率提升 30% 以上。两种方法均可修正模式温度预报较实况明显偏低的问题。随着时效的延长,历史偏差订正方法相对于滑动平均误差订正方法的优势逐渐显现。

(3)两种订正方法在全年各月份均有正的预报订正技巧,1—3 月预报订正效果尤为明显。在 6—10 月,订正后的温度预报平均绝对误差基本在 2°C 以内,具有较好的参考性。采用两种订正方法制作的延伸期逐日精细化订正预报可以为预报员日常业务提供一定的参考,以满足当前迫切的服务需求。

(4)两种订正方法能修正模式温度预报的系统性偏差,但无法订正模式对变温时间的预报误差。利用动力-统计相结合的方法进行数值模式预报产品的解释应用可能是实现延伸期气象要素预报时间偏差订正的有效途径。

目前国外主流气象中心的延伸期预报产品多以客观化和概率化相结合的方式展现。相对而言,我国决策者和公众对概率预报的接受程度还比较低。从本文研究也可看出,在不同的季节,预报的准确率差异较大,可信度不一样。因此,需要进一步发展我国的延伸期精细化概率预报技术,推广气象概率预报理念。

致谢:感谢国家气象中心唐健和宫宇给本文的修改完善提供了宝贵的建议和意见。

参考文献

- 陈豫英,陈楠,王素艳,等,2011. MOS 方法在动力延伸期候平均气温预报中的应用[J]. 应用气象学报,22(1):86-95. Chen Y Y, Chen N, Wang S Y, et al, 2011. Application of MOS method on pentad mean temperature prediction in dynamical extended range[J]. J Appl Meteor Sci, 22(1):86-95(in Chinese).
- 丑纪范,1990. 大气动力学的新进展[M]. 兰州:兰州大学出版社:214. Chou J F, 1990. Progress in Atmospheric Dynamics[M]. Lanzhou: Lanzhou University Press:214(in Chinese).
- 崔慧慧,智协飞,2013. 基于 TIGGE 资料的地面气温延伸期多模式集成预报[J]. 大气科学学报,36(2):165-173. Cui H H, Zhi X F, 2013. Multi-model ensemble forecasts of surface air temperature in the extended range using the TIGGE dataset[J]. Trans Atmos Sci, 36(2):165-173(in Chinese).
- 董全,黄小玉,宗志平,2012. 模式地面气温订正中的最优滑动训练期分析[J]. 天气预报技术总结专刊,4(2):93-98. Dong Q, Huang X Y, Zong Z P, 2012. Analysis of optimal running training period in mdl ground temperature correction[J]. Wea Forecasting Rev, 4(2):93-98(in Chinese).
- 李莉,李应林,田华,等,2011. T213 全球集合预报系统性误差订正研究[J]. 气象,37(1):31-38. Li L, Li Y L, Tian H, et al, 2011. Study of bias-correction in T213 global ensemble forecast[J]. Meteor Mon, 37(1):31-38(in Chinese).
- 刘还珠,赵声蓉,陆志善,等,2004. 国家气象中心气象要素的客观预报—MOS 系统[J]. 应用气象学报,15(2):181-191. Liu H Z,

- Zhao S R, Lu Z S, et al, 2004. Objective element forecasts at NMC—a MOS system[J]. *J Appl Meteor Sci*, 15(2):181-191(in Chinese).
- 马清, 龚建东, 李莉, 等, 2008. 超级集合预报的误差订正与集成研究[J]. *气象*, 34(3):42-48. Ma Q, Gong J D, Li L, et al, 2008. Study of bias-correction and consensus in regional multi-model super-ensemble forecast[J]. *Meteor Mon*, 34(3):42-48(in Chinese).
- 邱学兴, 王东勇, 陈宝峰, 2012. T639 模式预报系统误差统计和订正方法研究[J]. *气象*, 38(5):526-532. Qiu X X, Wang D Y, Chen B F, 2012. The statistics and correction of T639 model forecast system errors[J]. *Meteor Mon*, 38(5):526-532(in Chinese).
- 任宏利, 丑纪范, 2005. 统计-动力相结合的相似误差订正法[J]. *气象学报*, 63(6):988-993. Ren H L, Chou J F, 2005. Analogue correction method of errors by combining both statistical and dynamical methods together[J]. *Acta Meteor Sin*, 63(6):988-993(in Chinese).
- 佟华, 郭品文, 朱跃建, 等, 2014. 基于大尺度模式产品的误差订正与统计降尺度气象要素预报技术[J]. *气象*, 40(1):66-75. Tong H, Guo P W, Zhu Y J, et al, 2014. Bias correction and statistical downscaling meteorological parameters forecast technique based on large-scale numerical model products[J]. *Meteor Mon*, 40(1):66-75(in Chinese).
- 薛谡彬, 陈娴, 张瑛, 等, 2019. ECMWF 高分辨率模式 2m 温度预报误差订正方法研究[J]. *气象*, 45(6):831-842. Xue C B, Chen X, Zhang Y, et al, 2019. Bias correction method for the 2 m temperature forecast of ECMWF high resolution model[J]. *Meteor Mon*, 45(6):831-842(in Chinese).
- 曾晓青, 薛峰, 赵瑞霞, 等, 2019. 几种格点化温度滚动订正预报方案对比研究[J]. *气象*, 45(7):1009-1018. Zeng X Q, Xue F, Zhao R X, et al, 2019. Comparison study on several grid temperature rolling correction forecasting schemes[J]. *Meteor Mon*, 45(7):1009-1018(in Chinese).
- Cheng W Y Y, Steenburgh W J, 2007. Strengths and weaknesses of MOS, running-mean bias removal, and Kalman filter techniques for improving model forecasts over the Western United States[J]. *Wea Forecasting*, 22(6):1304-1318.
- Cui B, Toth Z, Zhu Y J, et al, 2012. Bias correction for global ensemble forecast[J]. *Wea Forecasting*, 27(2):396-410.
- Glahn H R, Lowry D A, 1972. The use of model output statistics (MOS) in objective weather forecasting[J]. *J Appl Meteor*, 11(8):1203-1211.
- Guan H, Cui B, Zhu Y J, 2015. Improvement of statistical postprocessing using GEFS reforecast information[J]. *Wea Forecasting*, 30(4):841-854.
- Guan H, Zhu Y J, Sinsky E, et al, 2019. Systematic error analysis and calibration of 2 m temperature for the NCEP GEFS reforecast of the subseasonal experiment (SubX) project[J]. *Wea Forecasting*, 34(2):361-376.
- Hamill T M, Whitaker J S, 2007. Ensemble calibration of 500 hPa geopotential height and 850 hPa and 2 m temperatures using reforecasts[J]. *Mon Wea Rev*, 135(9):3273-3280.
- Lorenz E N, 1963. Deterministic nonperiodic flow[J]. *J Atmos Sci*, 20(2):130-141.
- Stensrud D J, Yussouf N, 2005. Bias-corrected short-range ensemble forecasts of near surface variables[J]. *Meteor Appl*, 12(3):217-230.
- Taylor A A, Leslie L M, 2005. A single-station approach to model output statistics temperature forecast error assessment[J]. *Wea Forecasting*, 20(6):1006-1020.